


Avertissements agricoles



ISSN 0754 6014

PROVENCE ALPES COTE D'AZUR



MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DIRECTION DE LA QUALITÉ
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

B P 95 84140 MONTFAVET

Téléphone (90) 88 21 83

- ARBORICULTURE - CULTURES LEGUMIERES - GRANDES CULTURES -

29 Mai 1986 - N°11

ARBORICULTURE

TOUTES ESPECES

COCHENILLES (virgule, rouge du poirier, Pou de San José et cochenille du mûrier sur pêcher) -
SURVEILLER LEUR PRESENCE EVENTUELLE.

Dans les parcelles hébergeant l'un de ces ravageurs, on interviendra à l'apparition des jeunes larves, soit début Juin en régions précoces et moyennes avec un produit à base de méthidathion (ULTRACIDE) : 40 g M.A./hl. On renouvelera ce traitement 15 jours après la première application.

ACARIENS - INTERVENIR SI LE SEUIL DE 65 % DE FEUILLES OCCUPEES EST ATTEINT.

OIDIUM - RENOUELER LE TRAITEMENT SUR LES ESPECES SENSIBLES.

ARBRES FRUITIERS A PEPINS

TAVELURES DU POMMIER et DU POIRIER - MAINTENIR LA PROTECTION PREVENTIVE EN TOUS VERGERS.

CARPOCAPSE DES POMMES et DES POIRES - RENOUELER LA PROTECTION OU LA COMMENCER.

- de 400 à 600 m., dès réception du bulletin avec un larvicide type phosalone.
- au-dessus de 600 m., dès maintenant avec le diflubenzuron (DIMILIN) et à partir du 8 Juin avec les autres produits classiques (larvicides).

TORDEUSE DE LA PELURE (Pandemis heparana) - INTERVENIR SI NECESSAIRE ET DES QUE POSSIBLE.

Au cas où aucun traitement n'a été fait au printemps, malgré des dégâts observés, utiliser méthomyl (LANNATE) : 75 g M.A./hl ou fluvalinate (KLARTAN) : 1,44 g M.A./hl également efficaces sur CARPOCAPSE et PUCERONS ou fenvalérate (SUMICIDIN) : 10 g M.A./hl ou fenpropathrin (DANITOL) : 10 g M.A./hl

MINEUSE CERCLEE SUR POMMIER - ETENDRE LA PROTECTION AUX REGIONS PLUS TARDIVES.

- dès maintenant entre 300 et 500 m d'altitude
 - et partir du 8 juin au-dessus de 500 m d'altitude
- } si on utilise un larvicide
(voir note bulletin précédent).

Renouveler la protection en toutes régions 14 à 21 jours après le premier traitement.

Additif : sur la note déjà envoyée et destinée aux exportateurs lire dans la colonne remarque : "efficace sur CARPOCAPSE, CAPUA et PANDEMIS" à la place de "efficace sur CARPOCAPSE et CAPUA"

ARBRES FRUITIERS A NOYAU

MONILIA SUR FRUITS - TRAITER EN FONCTION DES RISQUES (climat, sensibilité, récolte).

CARPOCAPSE DES PRUNES - COMMENCER LA PROTECTION,

en secteurs précoces et sur variétés tardives, dès maintenant avec phosalone ou azinphos (larvicides).

FORFICULES - EN VERGERS HABITUELLEMENT ATTEINTS.

Intervenir de préférence la nuit avec naled (ORTHO-DIBROM) : 100 g M.A./hl.

CYCLOCONIUM et FUMAGINE SUR OLIVIER - A SURVEILLER.

Si l'on observe leur présence, on ajoutera un fongicide cuprique (250 g de cuivre métal/hl.).

P54

TEIGNE et PSYLLE DE L'OLIVIER - PREMIER TRAITEMENT.

En vergers généralement infestés par la *TEIGNE*, intervenir dès l'ouverture des toutes premières fleurs avec :

bacillus thuringiensis (BACTOSPEINE, DILPEL)	dose suivant spécialité, ce produit préserve la faune auxiliaire.
carbaryl	(CARBATOX, KUMITAL, SEVIN) : 125 g M.A./hl.
diméthoate	(nombreuses spécialités) : 50 g M.A./hl, efficace aussi sur <i>PSYLLE</i> .

ATTENTION AUX PUCERONS.

CYPRES BLEUS et CEDRES

En cas d'attaques (jaunissement des feuilles), effectuer un traitement à base de pyrimicarbe (PIRIMOR) : 37,5 g M.A./hl. Atteindre également l'intérieur de la haie.

GRANDES CULTURES

CEREALES

STADE PHENOLOGIQUE - FLORAISON.

MALADIES -

ROUILLE BRUNE -

En développement sur variétés sensibles (Mondur, Primadur).

Intervenir si vous ne l'avez déjà fait et si vous observez des pustules sur l'une des trois dernières feuilles. Pour les parcelles déjà traitées revenir si vous constatez un redémarrage de la *ROUILLE BRUNE* en particulier sur la dernière feuille.

SEPTORIOSE -

Attaque de *SEPTORIA NODORUM* parfois importante sur la 3ème feuille. Intervenir si 20% des F3 sont atteintes et si votre blé n'a pas dépassé la floraison.

Pour le choix des produits, voir notre bulletin N°10 Bis.

RAVAGEURS -

TRES PEU ou PAS DE PUCERONS -

Surveiller l'évolution des populations pendant la période sensible de la céréale (de la floraison au stade laiteux). Pas d'intervention préventive.

MAÏS

VERS GRIS -

Dégâts observés en Camargue (pieds sectionnés). Voir notre bulletin N°9.

CULTURES LEGUMIERES

PLEIN CHAMP

MOUCHE DU CHOU SUR NAVET -

Le vol se prolonge. Renouveler une dernière fois la protection sur les navets récoltés après le 15 Juin.

MOUCHE DE LA CAROTTE -

Le vol est terminé.

DORYPHORE SUR POMME DE TERRE -

Les infestations se prolongent. Surveiller le développement des jeunes larves et renouveler le traitement si nécessaire.

FAMILLE CHIMIQUE	MATIERE ACTIVE	SPECIALITE	DOSE PC/HA	REMARQUES
PHENOL	dinocap	KARATHANE	suivant la spécialité	Action acaricide Agit à température plus basse que le soufre
AMIDES	triforine	FUNGINEX	150ml	Action sur Rouille ,ne tache pas.
QUINOXALINES	chinométhionate	MORESTAN	30g	Action acaricide
	bupirimate	NIMROD	100ml	Effet de vapeur, stoppe la sporulation
PYRIMIDINES	fénarimol	RUBIGAN 4	100ml	Systémique et éradicant
SULFAMIDES	dichlofluanide	EUPARENE	300g	Préventif et curatif ,action sur acariens
MORPHOLINES	dodémorphe	MEHLTAUMITTEL	200ml	Systémique, préventif et curatif.
IMIDAZOLES	imazalil	FUNGAFLOR	200ml	Systémique,curatif ,action sur Marsonina
	triadimefon	BAYLETON 100	150g	Eviter les utilisations répétées sous serre
TRIAZOLES	propiconazole	GESAL		Systémique, préventif et curatif
	bitertanol	BAYCOR 300	100ml	Préventif et curatif, action sur Marsonina et rouille

Ravageurs du Muflier

Surveiller les attaques de pucerons et de punaises vertes. ;

Acariens du Rosier

Ajouter à la liste des produits utilisables:

avermectines (25 ml de VERTIMEC par hectolitre).

ooo00ooo